

Välgkanter med högväxta gräs och invasiva växter ska slås tidigt

Välgkanter med kvävegynnade örter och högväxta gräs, samt de med invasiva arter ska behandlas annorlunda. Dessa behöver, till skillnad från de blomrika välgkanterna, istället slåstras tidigt och gärna mer än en gång under säsongen. För att ängsblommorna ska trivas krävs mager mark, eftersom de lätt konkurreras ut av den kvävegynnade floran.

Forsla bort avslaget gräs och blommor för att undvika gödning

Kvävegödningen från mark och luft är ett hot mot mångfalden. Åratal av kvävenedfall har gödlat all mark. Gödslingseffekten ökar dessutom om grönmassorna lämnas kvar på slagna välgkanter. Den allt frodigare gräsdominerade grönskan kan också bli mer kostsam när flera klippningar krävs. Massorna är svåra att samla upp och föra bort, men detta är ett mycket angeläget problem att lösa. Magra, blomrika välgkanter, som inte behöver slås lika ofta kan bli en vinst för både ekonomin och miljön.

Hundkäs och högväxta gräs är tecken på övergödning

Hundkäs är skir, vacker och gillas av många insekter när den blommar, men den är ett tecken på att marken är kväverik även om den själv inte bidrar så mycket. Värre är de högväxta gräsen, som bergrör, vilka gärna tar över i välgkanten. Bestånden kan bli höga och täta och därmed vara både en säkerhetsrisk och leda till avrinningsproblem.

Från omgivande igenväxande marker kan också kvävegynnade växter som älggräs tränga in i välgkanten och konkurrera ut ängsblommorna.

Lupiner och andra invasiva arter hotar mångfalden

Vid midsommartid färgar lupinerna många välgkanter i blått, rosa och ljuslila. De senaste decennierna har dessa införda trädgårdsväxter inte bara intagit välgkanterna utan också därifrån spridits ut i ängs- och betesmarker. Invasiva arter är ett stort hot mot välgkanternas mångfald. De tar plats och tränger undan andra växter ovan

jord. Under marken har lupinen rötter med kvävefixerande bakterier, som göder och slår ut den rika ängsfloran som kräver magra marker. Ovan jord har de snart gått i frö och fjärilarna, humlorna och andra bin kan inte flyga till nya växter eftersom de inte finns längre! Som alla invasiva arter är lupinerna svåra att bekämpa. Ju fler blommor, frön och plantor som tidigt slås av desto bättre är det. Man kan också gräva upp dem med rötterna. Allt måste bortforslas och gärna brännas så att inga frön sprids på nytt. Det är viktigt att begränsa bestånden och hejda nyetableringar.

Total restaurering gynnar ängsblommorna

Ibland krävs total restaurering av välgkanten, vilket kan innebära att man skrapar ner till mineraljorden, som vid vägdikning. Detta gör man för att få tillbaka en mager miljö som gynnar ängsblommorna. Det innebär också att man slipper slå välgkanten under flera år, vilket är en besparing som kan kompensera för den ökade kostnaden.

Krossgrus och makadam som marktäckning missgynnar våra vildbin

Krossgrus och makadam är mindre kända hot mot mångfalden. Dessa material används idag som ytskikt i olika vägsammanhang. I detta marktäcke kan inga vildbin skapa sina bohålor. För detta behöver de mer finkornigt material. Sjuttio procent av alla svenska biarter, varav många är rödlistade, har sina bon i marken. Det är dessutom svårt för blommorna, som bina söker pollen hos, att gro bland krossgrus och makadam.

Så får vi blomrika välgkanter:

- ✓ Identifiera de blomrikare välgkanterna och vänta med slåtter av dem till efter mitten av augusti.
- ✓ Övergödda välgkanter med högväxta gräs ska istället slås tidigt och gärna mer än en gång.
- ✓ Forsla bort det avslagna för att få och behålla den magra miljö som gynnar ängsblommorna.
- ✓ Invasiva arter som lupiner hotar mångfalden och bör slås tidigt – gärna flera gånger – och avlägsnas. Man kan också gräva upp dem med rötterna.
- ✓ Undvik att täcka med krossgrus och makadam – det missgynnar många vildbin och blommor.
- ✓ Identifiera, vårda eller skapa nya magra, gärna sandiga, välgkanter och vägslänter. Särskilt de som ligger i varma, väl solbelysta lägen är viktiga för marklevande vildbin och mångfalden.



Naturskyddsföreningen



Blomrika

Välgkanter



Så skapar du vackra och blomrika miljöer för bin, fjärilar och andra pollinatörer

I NORRA SVERIGE

Både kvävegynnade och invasiva arter är ett hot mot mångfalden.

Bergrör

Lupiner

Hundkäs

Älggräs

Klöverhumla

Ärtväxer lockar många insekter och en särskilt populär sådan växt är kråkvicker, här med två bra signalarter.

Ängsmetallvinge

OPERATION:
RÄDDA BINA
Läs mer om hur du kan bidra på
www.raeddabina.nu

Foldern finns i två versioner; en för södra och mellersta Sverige (Art nr N0058) och en för norra Sverige (Art nr N0059).


Kontakt och text: Ebba Werner, blomrika.vagkanter@gmail.com
Illustration och grafisk formgivning: Frida Nettelblatt

Vägkanterna är viktigare än någonsin tidigare

Ängsmarker är artrika blommande miljöer, som är mycket viktiga för bin, fjärilar och andra insekter. Nästan inga ängar finns kvar i landet, mindre än en procent av de som fanns i början på 1900-talet. Men det finns många vägkanter, som genom att skötas rätt, kan bli vackra, blomrika och gynna många av de insekter som håller på att försvinna idag.

Varför ska vi bry oss om vägkanterna?

Vägkanterna är många och långa. De går genom alla landskapstyper, de följer breda asfalterade vägar, mindre grusvägar och förgrenar sig ut längs små skogs- eller markvägar. I en grön infrastruktur kan de vara både uppehållsplatser och spridningskorridorer för djur och växter. Det är nödvändigt att ta hänsyn till mångfalden i en tid när pollinerande och andra insekter försvinner i en oroväckande takt. Deras naturliga platser, ängarna och betesmarkerna



Ängsgentiana

Varje landsdel har sina speciella vägkantsarter som måste bli sedda och vårdade. Berggrund, klimat, omgivning och växthistoria ger olika förutsättningar. Ängsgentiana kräver både kalkhaltig, mullrik mark och låg vegetation. Den är alltså beroende av att platser med rätt markförhållanden hävdas sent på säsongen för att den ska kunna finnas kvar.

Trädgårdshumla

Svartfläckig glanssmygare



Flygtider för några av vägkantens insekter

	Juni	Juli	Augusti
Svartfläckig glanssmygare	■	■	■
Ängsmetallvinge		■	■
Violettkantad guldvinge		■	■
Turkos blåvinge		■	■
Svartsmalbi	■	■	■

Basta slättertid

Den bästa tiden för slätter av blomrika vägkanter är efter mitten av augusti. Då har många insekter flugit klart och de flesta blommorna hunnit sätta frö.

Bilden visar några av de växter och djur som kan finnas i en värdefull vägkant i norra Sverige. En blomrik vägkant kan bli traktens stolthet!